

ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE RECTALE

MATÉRIEL


- Médication
- FADMe
- Gants propres
- Gelée hydrosoluble
- Mouchoirs
- Si médicament liquide : tube nasogastrique de calibre adapté à l'âge de l'enfant.

NORMES

- Distraindre l'enfant et lui maintenir les fesses ensemble jusqu'à ce que le risque d'expulsion soit disparu, soit 5-10 minutes.
- Un suppositoire peut être fractionné en deux sections égales sur la longueur uniquement, afin d'assurer une répartition égale du médicament. L'utilisation de ciseaux est recommandée.
- Si la dose médication prescrite ne correspond pas à la concentration des suppositoires disponibles, l'utilisation d'un médicament liquide est recommandée.

ALERTES

- S'assurer que le patient n'a aucune contre indication à cette voie d'administration.
- **Ne pas utiliser cette voie si le patient est immunosupprimé.**
- Il faut s'assurer de passer le sphincter interne dans le but de prévenir l'expulsion.
- Pour la néonatalogie :
 - ✓ les suppositoires sont administrés de façon exceptionnelle. Les médicaments liquides sont administrés via la voie rectale.
 - ✓ il n'est pas indiqué de couper le tube gastrique.



- ✓ Injecter de l'eau stérile à usage oral et non de l'air pour l'étape #16.

RÉFÉRENCES

- Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (2010, MAJ 2018). Méthodes de soins informatisées. Administration d'un médicament par voie rectale.
- Ball, J., Bindler, R. (2010). L'administration des médicaments. *Soins infirmiers en pédiatrie 2^{ème} édition*. (p.A-35). Saint- Laurent : Édition du renouveau pédagogique inc.

