

## ADMINISTRATION D'UN MÉDICAMENT PAR VOIE INTRANASALE

### MATÉRIEL

- Médicament préparé par la pharmacie ou préparer le médicament prescrit à partir d'une fiole ou d'une ampoule à injecter (Voir TSI)
- Seringue Luer-lock de 1mL
- Aiguille
- Dispositif MAD-300
- Feuille d'administration des médicaments
- Matériel d'hygiène nasale PRN (Voir TSI)

### NORMES

- Le volume maximal à administrer par narine est de 1 mL.
- Vous devez diviser le volume à administrer également entre les deux narines afin de maximiser la surface d'absorption.
- Utilisez la médication la plus concentrée disponible afin de minimiser le volume à administrer.

### ALERTES

- Contre-indications à l'utilisation de la voie intranasale : Patient âgé de moins d'un an, épistaxis, anomalie anatomique des voies nasales.

### CONSULTATIONS

- Christopher Marquis, pharmacien
- Dr Évelyne Doyon-Trottier, pédiatre urgentiste

### RÉFÉRENCES

- Document MAD Nasal récupéré le 15 janvier 2018 au <http://www.lmaco.com/products/lma-mad-nasal>
- Therapeutic Intranasal Drug Delivery. Document récupéré le 19 octobre à l'adresse : <http://www.intranasal.net/>

