



PRÉPARATION D'UN MÉDICAMENT INJECTABLE

Préparer le médicament à partir d'une ampoule

MATÉRIEL

- Médicament en ampoule ou en
- Seringues et aiguilles
- Tampons d'alcool 70%
- Solution pour diluer **PRN** (solvant)
- Étiquette d'identification
- **FADM**

NORMES

- Cette technique doit être effectuée de façon stérile
- Ne pas injecter de l'air dans une ampoule, le liquide serait expulsé hors de l'ampoule.
- S'assurer au moment du prélèvement que le médicament ne doit pas être prélevé à partir d'une aiguille filtrante.
- Une fois le médicament prélevé dans une seringue, l'aiguille doit être changée si elle a été contaminée ou si le calibreou la longueur de l'aiguille ne correspondent pas à la voie d'administration
- Nettoyer le plan de travail avant toute préparation de médicament

RÉFÉRENCES

- Gorski, L., Hadaway, L. Hagle, M. E., McGoldrick, M., Orr, M., & Doellman, D. (2016). Infusion Therapy. Standards of Practice. Journal of Infusion Nursing, 39
- Lemire, C., Poulin, S. (2010). Soins infirmiers Méthodes de soins 1. (p.355-358). Saint-Laurent: Chenelière éducation
- Lippincott's, Williams & Wilkins. (2013). Nursing procedures, sixth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Politiques et procédures (2019). Politique et procédure département de pharmacie: Administration de médicaments par voie intraveineuse.

ÉTAPES

Se référer à la section préambule pour les étapes applicables à toutes les techniques de soins infirmiers.

Se référer à la section préambule de l'administration des médicaments pour les étapes applicables à toutes les techniques reliées à l'administration des médicaments

3

Abouter l'aiguille à la seringue

Donner des chiquenaudes sur la partie supérieure de l'ampoule

Ouvrir un tampon d'alcool et le placer au pourtour du collet de l'ampoule

Casser le collet de l'ampoule en le pliant d'un mouvement ferme et rapide vis-àvis la marque

Déposer l'ampoule sur une surface plane et propre

Tenir la seringue avec la main dominante et retirer le capuchon protecteur de l'aiguille sans la contaminer en évitant qu'elle touche le pourtour du capuchon

Déposer le capuchon sur un tampon d'alcool

Prendre l'ampoule entre l'index et le majeur et la retourner ou la laisser sur une surface plane

11

Introduire l'aiguille au centre de l'ampoule en évitant que l'aiguille entre en contact avec le bord de l'ampoule.

12

Maintenir l'aiguille immergée dans le liquide.

13

Aspirer le médicament en tirant sur le piston.

Retirer l'aiguille de l'ampoule et tenir la seringue à la verticale.

suite verso

15

Donner des chiquenaudes sur la seringue afin d'évacuer les bulles d'air

16

Tirer légèrement sur le piston puis appuyer sur le piston vers le haut afin d'évacuer les bulles jusqu'à l'apparition d'une goutte de liquide dans le biseau de l'aiguille

17

Au besoin, expulser le surplus de liquide dans un contenant biorisque en dirigeant l'aiguille vers le bas.

▼ 18

Tenir la seringue vers le haut à la hauteur des yeux et bien vérifier que le volume prélevé correspond à la quantité prescrite.

•

19 Recouvrir l'aiguille avec son capuchon toujours stérile.

20

Apposer l'étiquette identifiant le patient et le médicament sur la seringue (voir préambule de médicament pour plus de détails)